

## ความเชื่อมั่นของการวัดผลตัวแปรพหุคูณ

### ความหมาย

ความเชื่อมั่นของการวัดผลตัวแปรพหุคูณ (Multivariate Reliability) คือ ความคงที่ของคะแนนที่วัดคุณลักษณะ (trait) ด้วยชุดของเครื่องมือวัดผลตั้งแต่ 2 เครื่องมือขึ้นไป

ถ้ากำหนดให้

$r_{tt(M)}$  คือ ค่าความเชื่อมั่นของการวัดผลตัวแปรพหุคูณที่มีจำนวน  $M$  เครื่องมือ

$|S^2_{T(M \times M)}|$  คือ ค่า determinant ของ Matrix ของความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมของคะแนนจริงจากการวัดด้วย  $M$  เครื่องมือ

$|S^2_{X(M \times M)}|$  คือ ค่า determinant ของ Matrix ของความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมของคะแนนที่สังเกตได้จากการวัดด้วย  $M$  เครื่องมือ

ดังนั้น นิยามทางคณิตศาสตร์ของความเชื่อมั่นของการวัดผลตัวแปรพหุคูณคือ

$$r_{tt(M)} = \frac{|S^2_{T(M \times M)}|}{|S^2_{X(M \times M)}|}$$

### ความเป็นมา

ในปี พ.ศ. ๒๔๕๓ ชาลส์ สเปียร์แมน (Charles Spearman) เสนอสมการของคะแนนที่สังเกตได้จากเครื่องมือการวัดผลแต่ละเครื่องมือว่า

$$X_i = T_i + E_i$$

เมื่อ  $X_i$  คือ คะแนนที่สังเกตได้ของคนที่  $i$

$T_i$  คือ คะแนนจริงของคนที่  $i$

$E_i$  คือ คะแนนความคลาดเคลื่อนของคนที่  $i$

สมการดังกล่าวนี้มีข้อตกลงว่า (1) ถ้าสอบวัดกับประชากรแล้วคะแนนทั้งสามชนิดในสมการนี้มีการกระจายเป็นโค้งปกติ (2) รายเฉลี่ยของ  $E_i$  เป็นศูนย์ (3)

สหสัมพันธ์ระหว่าง  $T_i$  และ  $E_i$  เป็นศูนย์ ถ้ามีการวัดลักษณะเดียวด้วยเครื่องมือที่คู่ขนานกันแล้วมีข้อตกลงเพิ่มขึ้นไปอีกสองข้อดังนี้ (4) สหสัมพันธ์ระหว่าง  $E_{i1}$  และ  $E_{i2}$  เป็นศูนย์ เมื่อ  $E_{i1}$  เกิดจากการวัดด้วยเครื่องมือวัดผลครั้งที่ 1 และ  $E_{i2}$  เกิดจากการวัดด้วยเครื่องมือวัดผลที่คู่ขนานกันเป็นครั้งที่ 2 (5) สหสัมพันธ์ระหว่าง  $E_{i1}$  และ  $T_{i2}$  เป็นศูนย์ เมื่อ  $T_{i2}$  คู่ขนานกับ  $T_{i1}$

จากข้อตกลงดังกล่าวมาแล้วทำให้ได้ว่า  $S^2_X = S^2_T + S^2_E$  สมการนี้มีค่าความแปรปรวนร่วมของคะแนนจริงและคะแนนความคลาดเคลื่อนเป็นศูนย์ จากสมการนี้สเปียร์แมนนิยามค่าความเชื่อมั่นของการวัดผลแต่ละเครื่องมือได้ว่า

$$r_{tt} = \frac{S^2_T}{S^2_X}$$

เมื่อ

$r_{tt}$  คือ ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดผลแต่ละเครื่องมือ

$S^2_T$  คือ ค่าความแปรปรวนของคะแนนจริง

$S^2_X$  คือ ค่าความแปรปรวนของคะแนนที่สังเกตได้

จากนิยามของการวัดผลดังกล่าวนี้นักวัดผลได้เสนอสูตรในการคำนวณค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดผลไว้มากมาย โดยแต่ละสูตรมีข้อตกลงที่แตกต่างกัน ดังเช่น

(1) สูตรของสเปียร์แมน - บราวน์ เสนอในปี พ.ศ. 2453

$$r_{tt} = \frac{2r_{12}}{1 + r_{12}}$$

เมื่อ  $r_{12}$  คือ สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนส่วนที่แบ่งข้อสอบออกเป็นสองส่วนเท่ากัน

(2) สูตรของรูลอน เสนอในปี พ.ศ. 2473

$$r_{tt} = 1 - \frac{S^2_d}{S^2_x}$$

เมื่อ  $S^2_d$  คือความแปรปรวนของคะแนนความแตกต่างระหว่างส่วนที่แบ่งครึ่ง

(3) สูตรของ สำเร็จ บุญเรืองรัตน์ เสนอในปี พ.ศ. 2512

$$r_{tt} = 1 - \frac{(S^2_{x1} + S^2_{x2} - 2r_{12}S_{x1}S_{x2})}{S^2_x}$$

เมื่อ  $S^2_{x1}$  คือ ค่าความแปรปรวนของคะแนนการวัดผลครั้งที่ 1

$S^2_{x2}$  คือ ค่าความแปรปรวนของคะแนนการวัดผลครั้งที่ 2

สำเร็จ บุญเรืองรัตน์ ได้สังเกตมานานว่าการวัดผลแต่ละครั้งมักใช้แบบทดสอบตั้งแต่สองฉบับขึ้นไป เช่น การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมีการใช้แบบทดสอบหลายฉบับคะแนนจากการสอบแต่ละฉบับย่อมมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ดังนั้นจึงควรนิยามค่าความเชื่อมั่นของการวัดผลที่มี M เครื่องมือ และสร้างสูตรในการคำนวณค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดผลที่มี M เครื่องมือ จากข้อสังเกตนี้ในปี พ.ศ. 2542 สำเร็จ บุญเรืองรัตน์ จึงเสนอว่า ถ้ามีการวัดผลด้วยเครื่องมือ M เครื่องมือแล้ว สมการของคะแนนที่สังเกตได้ของแต่ละคนที่วัดด้วยแต่ละเครื่องมือสามารถเขียนในรูปของ Matrix ได้ว่า

$$X_{i1} = T_{i1} + E_{i1}$$

$$X_{i2} = T_{i2} + E_{i2}$$

$$X_{i3} = T_{i3} + E_{i3}$$

$$-- = ---$$

$$-- = ---$$

$$-- = ---$$

$$X_{iM} = T_{iM} + E_{iM}$$

สมการทั้งหมดนี้สามารถเขียนสรุปในรูปสมการ Matrix ได้ว่า

$$\underset{\sim}{X}_i = \underset{\sim}{T}_i + \underset{\sim}{E}_i$$

แต่ละสมการ  $X_i = T_i + E_i$  นั้นย่อมเป็นไปตามข้อตกลงของทฤษฎีการวัดผลแบบคลาสสิกคอลและถ้ากำหนดข้อตกลงเพิ่มเข้าไปอีกว่า (1) เครื่องมือวัดผลแต่ละเครื่องมือที่วัดผลได้ลักษณะเด่นของคุณลักษณะที่วัด (2)  $X_{i1}, X_{i2}, X_{i3}, \dots, X_{im}$  มีสหสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (3)  $T_{i1}, T_{i2}, T_{i3}, \dots, T_{im}$  มีสหสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (4)  $E_{i1}, E_{i2}, E_{i3}, \dots, E_{im}$  มีสหสัมพันธ์เป็นศูนย์

จากข้อตกลงดังกล่าวนี้ สำเร็จ บุญเรืองรัตน์ ได้เสนอนิยามของค่าความเชื่อมั่นของการวัดผลตัวแปรพหุคูณ ดังนี้

$$r_{tt(M)} = \frac{|S^2_T(M \times M)|}{|S^2_X(M \times M)|}$$

### สูตรในการคำนวณค่าความเชื่อมั่นของการวัดผลตัวแปรพหุคูณ

จากนิยามค่าความเชื่อมั่นของการวัดผลตัวแปรพหุคูณดังกล่าวมาแล้ว ในปี พ.ศ. 2542 เช่นกัน สำเร็จ บุญเรืองรัตน์ ได้ปรับขยายสูตรของ พี.เจ. รูลอน (P.J. Rulon) เสนอเป็นสูตรการคำนวณค่าความเชื่อมั่นของการวัดผลตัวแปรพหุคูณได้ดังนี้

$$r_{tt(M \times M)} = 1 - \frac{|S^2_d(M \times M)|}{|S^2_X(M \times M)|}$$

เมื่อ  $S^2_d(M \times M)$  คือ ค่า determinant ของ Matrix ของความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมของคะแนนความแตกต่างระหว่างคะแนนส่วนที่แบ่งครึ่ง (d) ของการวัดที่ได้จากเครื่องมือวัดผลแต่ละเครื่องมือ

นิยามและสูตรในการคำนวณค่าความเชื่อมั่นของการวัดผลตัวแปรพหุคูณ ที่ สำเร็จ บุญเรืองรัตน์ เสนอมีคุณค่าแตกต่างจากนิยามและสูตรที่เคยเสนอกันมา ดังนี้

1. เป็นนิยามที่ใช้ได้กับการวัดผลด้วย M เครื่องมือ สูตรเดิมใช้ได้เฉพาะเครื่องมือเดียว

2. เป็นนิยามหรือสูตรที่ใช้คำนวณค่าความเชื่อมั่นของการวัดผลที่เป็นกลุ่มของเครื่องมือวัดผลรวมไปถึงใช้ได้กับเครื่องมือเดียว

## ประโยชน์

การคำนวณค่าความเชื่อมั่นของการวัดผลตัวแปรพหุคูณ ทำให้เห็นภาพรวมของความเชื่อมั่นการวัดผลด้วยเครื่องมือทุกชนิดที่ใช้ในการวัดผลครั้งนั้นๆ ในการวิจัยทางการศึกษาและจิตวิทยาที่ใช้เครื่องมือวัดผลมากมาย การคำนวณค่าความเชื่อมั่นของการวัดผลตัวแปรพหุคูณจะทำให้ทราบค่าความเชื่อมั่นรวมของข้อมูลการวิจัยทั้งหมดได้ดี ดังตัวอย่าง ในปี พ.ศ. 2543 สำเร็จ บุญเรืองรัตน์ และ ราชันย์ บุญธิมา ได้คำนวณค่าความเชื่อมั่นของการ

วัดผลตัวแปรพหุคูณของแบบทดสอบความถนัดสามฉบับ ที่วัดความสามารถด้านภาษา วัดความสามารถด้านเหตุผล และวัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์แบบทดสอบทั้งสามฉบับนี้เป็นแบบทดสอบมาตรฐานของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ค่าความเชื่อมั่นของการวัดผลตัวแปรพหุคูณของแบบทดสอบความถนัดทั้งสามฉบับมีค่าเท่ากับ .9685 ซึ่งถ้าคำนวณค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบแต่ละฉบับซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง .6129 - .7315

สำเร็จ บุญเรืองรัตน์

## บรรณานุกรม

- สำเร็จ บุญเรืองรัตน์. “การหาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีแบ่งข้อสอบ,” **พัฒนาวัดผล** 4. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พีระพัชณา, 2512.
- สำเร็จ บุญเรืองรัตน์. “นิยามค่าความเชื่อมั่นของการวัดผลตัวแปรพหุคูณ,” **วารสารการวัดผลการศึกษา**. 21(61) : 53 - 57 ; พฤษภาคม - สิงหาคม 2542.
- สำเร็จ บุญเรืองรัตน์. “สูตรในการคำนวณค่าความเชื่อมั่นของการวัดผลตัวแปรพหุคูณ,” **วารสารการวัดผลการศึกษา**. 21(62) : 34 - 38 ; กันยายน - ธันวาคม 2542.
- สำเร็จ บุญเรืองรัตน์ และ ราชันย์ บุญธิมา. “การศึกษาความเชื่อมั่นพหุคูณของการวัดความถนัดทางการเรียน” **วารสารการวัดผลการศึกษา**. 22(64) : 47 - 52 ; พฤษภาคม - สิงหาคม 2543.
- Magnusson, D. *Test Theory*. Massachusetts : Addison - Wesley Publishing Company, 1967.
- Gulliksen, H. *Theory of Mental Test*. New York : Wiley, 1950.
- Rulon, P.J. “A Simplified Procedure for Determining the Reliability of a Test by Split - Halves,” **Harvard Educational Review**. 9 : 99 - 103 ; 1939.