

คำถ้ามจากภาพ

ผู้ป่วยเด็กหญิงอายุ 12 ปี มีผื่นที่บริเวณหัวไหล่ซ้าย

จะให้การวินิจฉัยผู้ป่วยรายนี้



ดูคำตอบหน้า 103

ເຊລຍ Molluscum contagiosum

ໜູດຂ້າວສຸກ (Molluscum contagiosum)

ເກີດຈາກເຫຼືອໄວຮັກຄຸມ Poxviridae subgenus molluscipox virus ສາມາຮັດຕິດຕ່ອກັນໄດ້
 ທາງກາຣສຳຜັສ ກາຣໃໝ່ຂອງໃໝ່ວ່າມກັນເຊັ່ນ ຜ້າເຫຼືດຕ້ວ ແລະສະວ່າຍໍ້ນໍ້າ

ອາກາຣແລະອາກາຣແສດງ

ລັກໜະນະເປັນຕຸ່ມນູນສື່ຂາວມັນ ຮ້ອສື່ໜູນພູ ຂະາດ 2-8 ມມ. ອາຈນີໂຮຍບຸ່ນມົງຕຽກລາງ ຜື່ນເປັນໄດ້
 ຖ້ວຕ້ວ ແຕ່ມັກເປັນທີ່ບົຣົວເນທີ່ມີກາຣເສີຍດສີ ຂັບເຊື້ນ ເຊັ່ນ ວັກແວ້ ລັ້ງຂ້ອເຂົ່າແລະຂາໜືບ ຜື່ນມັກອູ່ເປັນ
 ກຸລຸ່ມບົຣົວເນໄກລ໌ເຄີຍກັນຫົວໜ້າເຈັບເປັນແນວຕາມຮອຍເກາໄດ້ ຜື່ນໜາຍເອງໄດ້ ໂດຍໃໝ່ເວລາເປັນປີ ແຕ່ມັກ
 ເກີດກາຣຕິດເຫຼືອໄປທີ່ບົຣົວເນອື່ນກ່ອນຈຶ່ງມັກດ້ອງໃຫ້ກາຣວັກຊາ

ກາຣວິນຈົ້າຢັກໂຮຄ flat warts, juvenile xanthogranuloma, molluscum-like infection

ກາຣວັກຊາ

1. Curettage ກາຣສະກິດອອກ ໂດຍໃໝ່ arterial clamp ຮົ້ອ comedone extractor ໂດຍໃໝ່
 ຈ່າວມກັບຍາຈາເນພາທີ່ ມັກໄດ້ຜລດີ
2. ຍາທາ ເລື່ອກໃໝ່ຢາໃນກຸລຸ່ມ keratolytic ເຊັ່ນ salicylic, topical tretinoin cream ຮ້ອຍໍາທາ
 ໄນກຸລຸ່ມ immunomodulator ເຊັ່ນ topical imiquimod

ເອກສາຣອ້າງອີງ

1. Paller AS, Mancini AJ. Hurwitz clinical pediatric dermatology. 3rd ed. Philadelphia:
 Elsevier Saunders.2006.
2. Weston WL, Lane AT, Morelli JG. Color textbook of pediatric dermatology. 3rd ed. St
 Louis: Mosby.1996.

ອາຈຸ່າ ຕວິສີຣີໂອົງທີ

ໜ່ວຍໂຮຄຜົວໜັງ ພາຍວິຊາກຸມາຮວ່າງສົດ ມາຮວິທຍາລັຍສົວນົມວິວໂຮ